

## Vaccinations obligatoires pour les nourrissons

| Âge approprié  | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 11 mois | 12 mois | 16-18 mois | 6 ans | 11-13 ans | 14 ans | 25 ans | 45 ans | 65 ans et +     |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|-------|-----------|--------|--------|--------|-----------------|
| BCG            |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| DTP            |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        | Tous les 10 ans |
| Coqueluche     |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| Hib            |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| Hépatite B     |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| Pneumocoque    |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| ROR            |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| Méningocoque C |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| Rotavirus      |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| Méningocoque B |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| HPV            |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |
| Grippe         |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        | Tous les ans    |
| Zona           |        |        |        |        |        |         |         |            |       |           |        |        |        |                 |

### Tuberculose (BCG)

La vaccination contre la tuberculose est la plus souvent recommandée à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans chez les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.

### Diphthérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP)

Les rappels de l'adulte sont recommandés à âges fixes soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

### Coqueluche

Le rappel de l'adulte contre la coqueluche se fait à 25 ans avec rattrapage possible jusqu'à 39 ans. La vaccination contre la coqueluche de la femme enceinte dès le 2<sup>e</sup> trimestre de grossesse est recommandée pour protéger son nourrisson.

### Haemophilus influenzae de type b (Hib)

Pour les enfants n'ayant pas été vaccinés avant 6 mois, un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu'à l'âge de 5 ans avec le vaccin monovalent (1 à 3 doses selon l'âge).

### Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la 1<sup>re</sup> année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

### Pneumocoque

Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée chez l'enfant et l'adulte à risque.

### Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

### Méningocoque C

À partir de l'âge de 12 mois et jusqu'à l'âge de 24 ans inclus, une dose unique est recommandée pour ceux qui ne sont pas déjà vaccinés.

### Rotavirus

Recommandé à tous les nourrissons à partir de 2 mois. Deux à trois doses (par voie orale) sont nécessaires selon le vaccin.

### Méningocoque B

Un rattrapage est possible jusqu'à l'âge de 2 ans pour les nourrissons n'ayant pas reçu les trois doses de vaccins recommandées à 3, 5 et 12 mois.

### Papillomavirus humain (HPV)

La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans inclus. De plus, la vaccination est recommandée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

### Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité (IMC > 40 kg/m<sup>2</sup>). La vaccination contre la grippe sera désormais proposée à tous les enfants de 2 à 17 ans.

### Zona

La vaccination est recommandée chez les personnes âgées de 65 à 74 ans inclus.

### Vaccination Covid

Retrouvez le schéma vaccinal actualisé sur [vaccination-info-service.fr](http://vaccination-info-service.fr)

Pour en savoir plus



**VACCINATION  
INFO SERVICE.FR**

Le site de référence qui répond à vos questions